



# 採用薬品と処方量

阪神北広域こども急病センター  
(2012.02.02 改訂)



## 解熱鎮痛剤

年齢	<3m	3-5m	6-11m	1-2y	3-5y	6-9y	10-12y	13-15y	成人
体重範囲	<6kg	6-7kg	8-9kg	10-14kg	15-20kg	21-32kg	33-47kg	48kg-	
計算基本体重	4.5kg	6.5kg	8.5kg	12.0kg	17.5kg	26.5kg	40.0kg	53.5kg	
<b>◆ アセトアミノフェン</b>									
アルピニー坐100	1/2個	2/3個	1	1		1			
アルピニー坐200				3/4	1	1	2	2	
カロナールシロップ2		3ml	5ml	7ml	10ml	15ml			
カロナール細粒20		0.3	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	2.0	
カロナール錠200					1	1.5	2	2	2

## 鎮咳去痰剤

年齢	<3m	3-5m	6-11m	1-2y	3-5y	6-9y	10-12y	13-15y	成人
体重範囲	<6kg	6-7kg	8-9kg	10-14kg	15-20kg	21-32kg	33-47kg	48kg-	
計算基本体重	4.5kg	6.5kg	8.5kg	12.0kg	17.5kg	26.5kg	40.0kg	53.5kg	
<b>◆ チペピジンヒベンズ酸</b>									
アスベリン散10%	0.1	0.1	0.15	0.2	0.3	0.45	0.6	1.0	
アスベリンシロップ0.5%	2ml	2ml	3ml	4ml	6ml	9ml			
アスベリン錠20mg						3	3	3	
<b>◆ カルボシステイン</b>									
ムコダインDS 50%	0.24	0.4	0.6	0.8	1.0	1.6	2.4	3.0	3.0
ムコダインS 5%	2.5ml	4ml	6ml	8ml	10ml	16ml			
ムコダイン錠250mg						3(750)	3(750)	6	6

## 抗菌剤

年 齢		<3m	3-5m	6-11m	1-2y	3-5y	6-9y	10-12y	13-15y	成人
体重範囲		<6kg	6-7kg	8-9kg	10-14kg	15-20kg	21-32kg	33-47kg	48kg-	
計算基本体重		4.5kg	6.5kg	8.5kg	12.0kg	17.5kg	26.5kg	40.0kg	53.5kg	
<b>◆ クラリスロマイシン (CAM)</b>		50mg	70mg	100mg	150mg	200mg	300mg	400mg	400mg	400mg
クラリスDS 10%	分 2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	4.0	
クラリス錠50							6	8	8	8
<b>◆ アモキシシリン (AMPC)</b>		120mg	180mg	250mg	350mg	500mg	700mg	750mg	750mg	750mg
サワシリン細粒10%	分 3	1.2	1.8	2.5	3.5	5.0	7.0	7.5	7.5	
<b>◆ セフカペン (CFPN)</b>		40mg	60mg	80mg	120mg	160mg	250mg	300mg	300mg	300mg
フロモックス細粒100mg	分 3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.6	2.5	3.0	3.0	
フロモックス錠75mg								3 (225mg)	3 (225mg)	3 (225mg)
<b>◆ セフジトレン (CDTR)</b>		40mg	60mg	80mg	120mg	160mg	250mg	300mg	300mg	300mg
メイアクトMS細粒100mg	分 3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.6	2.5	3.0	3.0	
メイアクトMS錠100mg								3	3	3
<b>◆ ホスホマイシン (FOM)</b>		320mg	400mg	600mg	800mg	1200mg	1600mg	2000mg	2000mg	2000- 3000mg
ホスミンDS 200	分 3	1.6	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	10.0	
ホスミン錠250								6(分3)	8(分4)	8(分4)

## 抗アレルギー剤

年齢	<3m	3-5m	6-11m	1-2y	3-5y	6-9y	10-12y	13-15y	成人
体重範囲	<6kg	6-7kg	8-9kg	10-14kg	15-20kg	21-32kg	33-47kg	48kg-	
計算基本体重	4.5kg	6.5kg	8.5kg	12.0kg	17.5kg	26.5kg	40.0kg	53.5kg	
<b>◆ ニポラジン・アレルギー</b>		0.6mg	1.0mg	1.5mg	2.1mg	3.0mg	4.8mg	6mg	6mg
ニポラジンシロップ0.03%	分 2	2ml	3ml	5ml	7ml	10ml			
ニポラジン細粒0.6%				0.2g	0.4g	0.5g	0.8g	1.0g	
ニポラジン錠3mg								2	2
<b>◆ ニポラジン・喘息</b>		1.2mg	2.0mg	3.0mg	4.2mg	6.0mg	9.6mg	12mg	12mg
ニポラジンシロップ0.03%	分 2	4ml	6ml	10ml	14ml	20ml			
ニポラジン細粒0.6%				0.5g	0.7g	1.0g	1.6	2.0	
ニポラジン錠3mg								4	4

## 抗ヒスタミン剤

<b>◆ ヒドロキシジン</b>		5.0mg	7.5mg	10mg	20mg	30mg	40mg	60mg	75mg	75mg
アタラックス-Pカプセル25mg	分 3							3	3	3
アタラックス-P散10%				0.1	0.2	0.3	0.4	0.6		
アタラックス-Pシロップ0.5%		1.0ml	1.5ml	2ml	4ml	6ml	8ml			
<b>◆ アリメマジン酒石酸</b>			1mg	2mg	3mg	4mg	5mg			
アリメジンシロップ0.05%	分 3		2ml	4ml	6ml	8ml	10ml			

## β2刺激薬

年 齢		<3m	3-5m	6-11m	1-2y	3-5y	6-9y	10-12y	13-15y	成人
体重範囲		<6kg	6-7kg	8-9kg	10-14kg	15-20kg	21-32kg	33-47kg	48kg-	
計算基本体重		4.5kg	6.5kg	8.5kg	12.0kg	17.5kg	26.5kg	40.0kg	53.5kg	
<b>◆ ツ ロ ブ テ ロ ー ル</b>				0.3mg	0.5mg	0.7mg	1.0mg	1.6mg	2.0mg	2.0mg
ベラチンドライシロップ0.1%	分 2			0.3	0.5	0.7	1.0	1.6	2.0	
ベラチン錠1mg								2	2	2
ホクナリンテープ0.5mg	1 回 / 日			1	1					
ホクナリンテープ 1mg						1	1			
ホクナリンテープ 2mg								1	1	1
<b>◆ 塩 酸 プ ロ カ テ ロ ー ル</b>		分	10μg	15μg	20μg	30μg	40μg	50μg		
メプチンシロップ 5μg/ml	2	2ml	3ml	4ml	6ml	8ml	10ml			

## 経口ステロイド剤

<b>◆ デカドロン・クループ症候群</b>		1 回	0.6mg	1.0mg	1.3mg	1.8mg	2.6mg	4.0mg	6mg	8mg	8mg
デカドロンエリキシル0.01%	6ml		10ml	13ml	18ml	26ml	40ml				
デカドロン・錠0.5mg							8	12	16	16	
<b>◆ デ カ ド ロ ン ・ 喘 息</b>		分 2	0.6mg	1.0mg	1.3mg	1.8mg	2.6mg	4.0mg	6mg	8mg	
デカドロンエリキシル0.01%	6ml		10ml	13ml	18ml	26ml	40ml				
デカドロン・錠0.5mg							8	12	16	16	



## 抗ヘルペスウイルス薬

◆ アシクロビル		5kg-	7kg-	9kg-	14kg-	19kg-	24kg-	29kg-	34kg-	39kg-
水痘・帯状疱疹 ゾビラックス顆粒40%	分 4	400mg	600mg	800mg	1200mg	1600mg	2000mg	2400mg	2800mg	3200mg
		1.0g	1.5g	2.0g	3.0g	4.0g	5.0g	6.0g	7.0g	8.0g
単純疱疹 ゾビラックス顆粒40%	分 4	400mg	600mg	800mg	800mg	800mg	800mg	800mg	800mg	800mg
		1.0g	1.5g	2.0g	2.0g	2.0g	2.0g	2.0g	2.0g	2.0g

## 抗インフルエンザウイルス薬

◆ オセルタミビル		10歳未満に処方 10歳未満の上限は120mg									
		5.0kg-	6.7kg-	8.2kg-	11kg-	13kg-	15.3-	18.3kg-	21.0kg-	24.0kg-	27.5kg-
タミフル(DS)	分 2	24mg	30mg	36mg	45mg	54mg	66mg	78mg	90mg	102mg	120mg
		0.8 g	1.0 g	1.2 g	1.5 g	1.8 g	2.2 g	2.6 g	3.0 g	3.4 g	4.0 g

◆ ラニナミビル吸入剤		確実に吸入が出来ること。 1容器(10mgx2)		
イナビル(10歳以上)	吸入	1回2容器		単回完結
イナビル(10歳未満)	吸入	1回1容器		単回完結
イナビル(追加投与)	吸入	1容器追加		追加吸入

# セ ッ ト 処 方

<3m	3-5m	6-11m	1-2y	3-5y	6-9y	10-12y	13-15y
<6kg	6-7kg	8-9kg	10-14kg	15-20kg	21-32kg	33-47kg	48kg-
4.5kg	6.5kg	8.5kg	12.0kg	17.5kg	26.5kg	40.0kg	53.5kg

## ◆アスムコ散

アスベリン散10%	分 3		10mg	15mg	20mg	30mg	45mg	60mg	
ムコダインDS 50%			200mg	300mg	400mg	500mg	800mg	1200mg	

## ◆アスムコシロップ

アスベリンシロップ0.5%	分 3		2ml	3ml	4ml	6ml	9ml		
ムコダインS5%			4ml	6ml	8ml	10ml	16ml		

## ◆カゼシロップ

アスベリンシロップ0.5%	分 3		2ml	3ml	4ml	6ml	9ml		
ムコダインS5%			4ml	6ml	8ml	10ml	16ml		
アリメジンシロップ0.05%			2ml	4ml	6ml	8ml	10ml		

## ◆アスムコ+メプチン

アスベリンシロップ0.5%	分 3		2ml	3ml	4ml	6ml	9ml		
ムコダインS5%			4ml	6ml	8ml	10ml	16ml		
メプチンシロップ5μg/ml			3ml	4ml	6ml	8ml	10ml		

## ◆カゼシロップ+メプチン

アスベリンシロップ0.5%	分 3		2ml	3ml	4ml	6ml	9ml		
ムコダインS5%			4ml	6ml	8ml	10ml	16ml		
アリメジンシロップ0.05%			2ml	4ml	6ml	8ml	10ml		
メプチンシロップ5μg/ml			3ml	4ml	6ml	8ml	10ml		

# 外用軟膏類

外用軟膏類	処方量	分類	適応
アクアチム軟膏1%	10g	新キノロン系抗菌剤	表在性、深在性皮膚感染症
アラセナA軟膏3%	2g	抗ウイルス剤	帯状疱疹、単純疱疹
エルタシン軟膏0.1%	10g	アミノグルコシド系 (ゲンタマイシン) 抗菌剤	表在性皮膚感染症
デキサルチン口腔用軟膏 1mg/g	2g	デキサメサゾン製剤	難治性口内炎、舌炎
テラ・コートリル軟膏	5g	テトラサイクリン・ヒドロコルチゾン配合剤	深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、浸潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染併発湿疹、皮膚炎
デルモゾールG軟膏	5g	リンデロン・ゲンタシン配合剤	浸潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染併発湿疹、皮膚炎
ホスポールクリーム1%	10g	抗真菌（ヒボナゾール）剤	皮膚真菌症
カチリ「ホエイ」	10g	フェノール・亜鉛華リニメント	皮膚掻痒症、汗疹、じん麻疹、虫さされ
レスタミンコーワクリーム 1%	10g	アレルギー性疾患	皮膚掻痒症、湿疹、じん麻疹、虫さされ

# 注射処方について

- ① 「輸液」より基本輸液を選択し輸液時間を指示
- ② 注射薬剤の追加は「汎用注射薬剤」及び「その他の注射薬」より選ぶ。  
輸液内に混合追加薬は1処方1剤です。2剤以上を混合する場合は一端確定した後、追加薬剤を選び、投与方法・時間を指示
- ③ 「汎用注射薬」は、患者体重で換算された標準使用量が表示される。
- ④ 「その他の注射薬」は投与量、投与方法を指示。

ソルメルコート125注 (1.5~2.0mg/kg)	<10kg	10kg-	15kg-	20kg-	30kg-	40kg-
	18.8mg	25.0mg	37.5mg	50.0mg	62.5mg	75.0mg
	0.15瓶	0.2瓶	0.3瓶	0.4瓶	0.5瓶	0.6瓶
注射用水2mL (注射用水の指示は不要)	0.3mL	0.4mL	0.6mL	0.8mL	1.0mL	1.2mL

ロセフィン静注用0.5g	<10kg	10kg-	15kg-	20kg-	30kg-	40kg-
	0.3g	0.5g	0.5g	0.5g	1.0g	1.0g

セルシン注射液10mg(2mL)	0.5mg(0.1mL)/kgの計算量。適宜増減してください					
	(例) 体重17kgなら 8.5mg 1.7mLと表示される					

ドルミカム5倍希釈： ドルミカム注射液10mg(2mL)が生理食塩水8mL で希釈される(10mg=10mL) (希釈用生食水の指示は不要)	0.15mg (0.15mL) /kgの計算量。適宜増減してください。					
	(例)体重17kgなら2.55mg 2.55mLと表示される					

ボスミン注1mg/1mL (皮下または大腿部筋注：アナフィラキシ)	0.01mL/kgの計算量。ただし上限は0.3mL					
	(例) 体重17kg なら0.17mL					
	(例) 体重40kgなら0.3mL					

ポララミン注5mg/mL	投与mg量を指示する	通常小児使用量は2~5mg
--------------	------------	---------------

# 処置 吸入

## β2刺激剤吸入（ベネトリン）

体 重	年 齢	ベネトリン	生理食塩水
～15kg未満	～3歳未満	0.1ml	2ml
15～25kg未満	3～6歳未満	0.2ml	
25～40kg未満	6～11歳未満	0.3ml	
40kg～	11歳～	0.4ml	

※ 30分ごと3回まで反復可能

---

## ボスミン液吸入

ボスミン液	生理食塩水
0.2mL	2mL

- ※ 年齢に関係なく同量を使用
- ※ 改善なければ30分ごとに吸入可

# 薬剤と保険適応について

## 抗生剤の保険適応

### ◆ 感染性腸炎に適応のある抗生剤

- ①ホスミシンドライシロップ・ホスミシン錠
- ②クラリスドライシロップ・クラリス錠

**注：フロモックス及びメイアクトMSは感染性腸炎の適応なし。**

### ◆ 【ホスミシン錠・ホスミシンドライシロップ】の適応症

深在性皮膚感染症、膀胱炎、腎盂腎炎、感染性腸炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎

**注：ホスミシンは上気道炎、気管支炎、肺炎などの呼吸器疾患及び表在性皮膚感染症には適応なし。**

## 抗アレルギー剤の保険適応

### ◆ アタラックスP

<適応症>

- ① 蕁麻疹、皮膚疾患に伴う掻痒（湿疹、皮膚炎、皮膚掻痒症）
- ② 神経症における不安・緊張・抑うつ

**注：アレルギー性鼻炎、上気道炎、気管支喘息などに適応なし。**

### ◆ ニポラジンシロップ・ニポラジン細粒・ニポラジン錠

<適応症>

気管支喘息、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴う掻痒（湿疹、皮膚炎、皮膚掻痒症）

**注：上気道炎、気管支炎には適応なし。**



## 採用薬品と処方量

公益財団法人 阪神北広域救急医療財団  
阪神北広域こども急病センター

